



AMD 5. Analgesia

Versione 1.3
approvata CDS 21.4.09

Accesso al paziente

OPQRST

Dolore SCA?

Si

AMD 4

No

Ossigenoterapia
SpO₂ ≥ 95%

Via venosa
NaCl 0,9% 500 ml

Valutare intensità dolore SVA
(ev. SVS)

SVA > 3

Si

Pz. incarcerato e/o con accesso
difficile alle vie aeree?

Si

Considera anestesia
generale dopo liberazione
del paziente

AMD 13

KETAMINA 0,25 - 0,5 mg/kg
ripetibile ogni 15-20 min.
+ MIDAZOLAM 1-2 mg IV
(+ ATROPINA 0,5 mg IV)

No

SVA ≥ 6 o SVS > 2

No

Si

Cave
pz. intossicato da:
- alcool
- benzodiazepine
- oppiacei
pz. grande obeso
pz. anziano
pz. con BPCO severa

MORFINA 0.1 mg/kg e.v.(max 10 mg)
se PA sist ≥ 90 mmHg e SpO₂ ≥ 90%
poi 2.5 mg IV ogni 5' (max 20 mg)
oppure
FENTANYL 1 µg/kg (max 2 µg/kg)

MORFINA 2.5 mg IV
se PA sist ≥ 90 mmHg
ripetibile ogni 5' (max. 10 mg)

Dolore persistente?

Si

Considera anestesia
generale

AMD 13

FENTANYL 2 µg/kg

No

Nausea/vomito?

Si

TROPISETRON 2 mg IV

No

Sorveglianza, annuncio precoce e
trasporto